

Функциональные уравнения и неравенства

1. (ММО, 2006, окружной тур, 11.3) Найдите все такие функции $f(x)$, что

$$f(2x + 1) = 4x^2 + 14x + 7.$$

$$\boxed{1 + x\xi + \zeta x = (x)f}$$

2. (Problems.ru, №35379) Найдите все функции $f(x)$, определённые при всех действительных x и удовлетворяющие уравнению

$$2f(x) + f(1 - x) = x^2.$$

$$\boxed{\frac{\xi}{1-x\zeta+\zeta x} = (x)f}$$

3. («Покори Воробьёвы горы!», 2015, 9.10) Найдите функцию $f(x)$, о которой известно, что

$$f(x) = \begin{cases} x \cdot f\left(\frac{2x+3}{x-2}\right) + 3 & \text{при } x \neq 2, \\ 0 & \text{при } x = 2. \end{cases}$$

$$\boxed{\frac{(1+x+\xi x)\zeta}{(x-\zeta)(1+x)\xi} = (x)f}$$

4. (МГУ, мехмат, 2008.5) Найти все функции f , удовлетворяющие уравнению

$$f(x) + (x - 2)f(1) + 3f(0) = x^3 + 2, \quad x \in \mathbb{R}.$$

$$\boxed{1 + x - \xi x = (x)f}$$

5. («Покори Воробьёвы горы!», 2019, 10–11.3) Найдите все возможные значения величины

$$T = \frac{f(t) - f(0)}{f(t^2) + f(t) - 2f(0) + 2},$$

если $f(2x + y) - f(x + y) = 2x$ для всех действительных значений x и y .

$$\boxed{\left[\frac{\xi}{1} : 1-\right]}$$

6. (ММО, 1991, 10.1) Функция $f(x)$ при каждом значении $x \in (-\infty, +\infty)$ удовлетворяет равенству

$$f(x) + \left(x + \frac{1}{2}\right) \cdot f(1 - x) = 1.$$

- а) Найдите $f(0)$ и $f(1)$.
б) Найдите все такие функции $f(x)$.

$$\boxed{\frac{\xi}{1} = \left(\frac{\xi}{1}\right) f \text{ и } \frac{\xi}{1} \neq x \text{ или } \frac{x\zeta-1}{\zeta} = (x)f \text{ (} \zeta \neq 0 \text{) и } \zeta = (1)f \text{ (} \zeta = (0)f \text{ (} \xi \text{))}$$

7. (Всеросс., 2000, ОЭ, 10.5) Существует ли функция $f(x)$, определённая при всех $x \in \mathbb{R}$ и для всех $x, y \in \mathbb{R}$ удовлетворяющая неравенству

$$|f(x+y) + \sin x + \sin y| < 2 ?$$

8. (Всеросс., 1994, ОЭ, 11.6) Функция $f(x)$ определена и удовлетворяет соотношению

$$(x-1) \cdot f\left(\frac{x+1}{x-1}\right) - f(x) = x$$

при всех $x \neq 1$. Найдите все такие функции.

9. (Всеросс., 2018, РЭ, 11.7) Функция $f(x)$, заданная на всей числовой оси, при всех действительных x и y удовлетворяет условию

$$f(x) + f(y) = 2f\left(\frac{x+y}{2}\right) f\left(\frac{x-y}{2}\right).$$

Верно ли, что функция $f(x)$ обязательно чётная?

10. (Всеросс., 1997, ОЭ, 11.8) Для каких α существует функция $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, отличная от константы, такая, что

$$f(\alpha(x+y)) = f(x) + f(y) ?$$

11. (Всеросс., 2000, финал, 11.1) Найдите все функции $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, которые для всех $x, y, z \in \mathbb{R}$ удовлетворяют неравенству

$$f(x+y) + f(y+z) + f(z+x) \geq 3f(x+2y+3z).$$

12. (Всеросс., 2005, финал, 11.5) Существует ли ограниченная функция $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ такая, что $f(1) > 0$ и $f(x)$ удовлетворяет при всех $x, y \in \mathbb{R}$ неравенству

$$f^2(x+y) \geq f^2(x) + 2f(xy) + f^2(y) ?$$

13. (Всеросс., 1993, финал, 11.3) Найдите все функции $f(x)$, определённые при всех положительных x , принимающие положительные значения и удовлетворяющие при любых положительных x и y равенству $f(x^y) = f(x)^{f(y)}$.

Периодичность

14. («Высшая проба», 2016, 10.4, 11.3) Функция $f(x)$, определённая при всех действительных x , является чётной. Кроме того, при любом действительном x выполняется равенство

$$f(x) + f(10-x) = 4.$$

- а) Приведите пример такой функции, отличной от константы.
- б) Докажите, что любая такая функция является периодической.

15. (ОММО, 2014.6) Найдите все периодические функции $y = f(x)$, удовлетворяющие уравнению

$$f(x) - 0,5f(x - \pi) = \sin x.$$

$$x \text{ и } \frac{x}{\pi} = (x)f$$

Функциональное уравнение Коши

Задача 13 показывает, что финалисту Всероссийской олимпиады желательно быть знакомым с теорией *функционального уравнения Коши*:

$$f(x + y) = f(x) + f(y).$$

Функцию, являющуюся решением уравнения Коши, будем называть *аддитивной*. Функцию $f(x) = ax$ ($a, x \in \mathbb{R}$) будем называть *линейной*. Легко проверить, что линейная функция является аддитивной. Возникает вопрос: при каких условиях, наоборот, аддитивная функция является линейной?

При отсутствии оговорок функция считается заданной на \mathbb{R} . Фигурирует также обозначение $\mathbb{R}_+ = (0; +\infty)$.

16. Докажите, что функция, аддитивная на \mathbb{Q} (множестве рациональных чисел), является линейной на \mathbb{Q} .

17. Докажите, что если аддитивная функция непрерывна на \mathbb{R} , то она линейна.

18. Докажите, что если аддитивная функция монотонна на некотором интервале $(a, b) \subset \mathbb{R}$, то она линейна.

19. Докажите, что если аддитивная функция $f(x)$ принимает положительные значения для всех $x > 0$, то она линейна.

20. Найдите все непрерывные функции $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$, удовлетворяющие уравнению

$$f(x + y) = f(x)f(y).$$

21. Найдите все непрерывные функции $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$, удовлетворяющие уравнению

$$f(xy) = f(x) + f(y).$$

22. Найдите все непрерывные функции $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$, удовлетворяющие уравнению

$$f(xy) = f(x)f(y).$$

Основные методы решения функциональных уравнений

Ниже предлагается перевод заметки [Basic Methods For Solving Functional Equations](#).

- *Подстановка конкретных значений переменных.* Чаще всего в качестве первой попытки можно подставить константы (например, 0 или 1), после чего (если возможно) использовать *подстановку выражений*, которые могут превратить какую-либо часть уравнения

в константу. Например, если в уравнении присутствует $f(x + y)$ и мы нашли $f(0)$, то подставляем $y = -x$. В более трудных задачах подстановки будут менее очевидными.

- *Математическая индукция.* С помощью этого метода, зная $f(1)$, находим $f(n)$ для любого целого n . Затем находим $f\left(\frac{1}{n}\right)$ и $f(r)$ для рациональных r . Данный подход применяется в ситуациях, когда функции определены на \mathbb{Q} , и является очень полезным, особенно в несложных задачах.
- *Исследование инъективности и сюръективности функций.* Во многих задачах установить данные факты несложно, а значение они могут иметь очень большое.
- *Нахождение неподвижных точек или нулей функций.* Количество задач, использующих данный метод, значительно меньше количества задач, в которых применяется какой-либо из трёх предыдущих подходов. Указанный метод встречается, как правило, в более сложных задачах.
- *Использование функционального уравнения Коши и уравнений, сводящихся к уравнению Коши.*
- *Исследование монотонности и непрерывности функции.* Непрерывность, как правило, даётся в качестве дополнительного условия и, так же как и монотонность, обычно используется при сведении задачи к уравнению Коши. В противном случае мы имеем дело с куда более сложной задачей.
- *Предположение, что в некоторой точке функция принимает большее или меньшее значение, чем функция, про которую мы хотим доказать, что она — решение.* Наиболее часто это используется как продолжение метода математической индукции и работает в тех задачах, где область значений функции ограничена сверху и снизу.
- *Использование рекуррентных соотношений.* Этот метод обычно используется в тех случаях, когда область значений функции ограничена, и когда мы можем найти связь между $f(f(n))$, $f(n)$ и n .
- *Исследование множества значений аргумента, при которых функция совпадает с предполагаемым решением.* Цель состоит в том, чтобы доказать, что описанное множество в точности совпадает с областью определения функции.
- *Функциональная подстановка.* Этот метод обычно используется для упрощения уравнения и редко имеет решающее значение.
- *Представление функции как суммы чётной и нечётной функций.* Именно, любая функция может быть представлена суммой чётной и нечётной функций, и это может оказаться очень удобно при рассмотрении «линейных» функциональных уравнений, содержащих много функций.
- *Использование числовых систем с основанием, отличным от 10.* Конечно, это может быть использовано только в том случае, когда область определения есть \mathbb{N} .
- *Очень важно угадать решение с самого начала.* Это может сильно помочь в нахождении подходящих подстановок. Также, в конце решения задачи НЕ ЗАБУДЬТЕ проверить, что найденное вами решение удовлетворяет заданным условиям.

Неподвижные точки

23. (*IMO, 1983*) Find all functions f defined on the set of positive real numbers which take positive real values and satisfy the conditions:

- (i) $f(xf(y)) = yf(x)$ for all positive x, y ;
- (ii) $f(x) \rightarrow 0$ as $x \rightarrow +\infty$.

$$\boxed{x/1 = (x)f}$$

24. (*IMO, 2015*) Let \mathbb{R} be the set of real numbers. Determine all functions $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ that satisfy the equation

$$f(x + f(x + y)) + f(xy) = x + f(x + y) + yf(x)$$

for all real numbers x and y .

$$\boxed{x - z = (x)f : x = (x)f}$$

Инъекция, сюръекция

25. (*IMO, 1992*) Let \mathbb{R} denote the set of all real numbers. Find all functions $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ such that

$$f(x^2 + f(y)) = y + (f(x))^2$$

for all $x, y \in \mathbb{R}$.

$$\boxed{x = (x)f}$$

26. (*Balkan MO, 2000*) Find all functions $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ such that

$$f(xf(x) + f(y)) = (f(x))^2 + y$$

for all $x, y \in \mathbb{R}$.

$$\boxed{x - = (x)f : x = (x)f}$$

27. (*IMO, 2009, Shortlist*) Find all functions f from the set of real numbers into the set of real numbers which satisfy for all real x, y the identity

$$f(xf(x + y)) = f(yf(x)) + x^2.$$

$$\boxed{x - = (x)f : x = (x)f}$$

Сужение, продолжение

28. (*IMO, 1999*) Determine all functions $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ such that

$$f(x - f(y)) = f(f(y)) + xf(y) + f(x) - 1$$

for all real numbers x, y .

$$\boxed{\frac{c}{c^x} - 1 = (x)f}$$