

Минимаксные задачи с параметрами

Данная статья служит продолжением статьи «[Минимаксные задачи. 1](#)», в которой были изложены основные идеи. Здесь мы разберём несколько задач и посмотрим, как минимаксные методы работают в задачах с параметрами.

Задача 1. (*МГУ, геологич. ф-т, 1990*) Найти все пары действительных чисел a и b , при которых уравнение

$$(3x - a^2 + ab - b^2)^2 + (2x^2 - a^2 - ab)^2 + x^2 + 9 = 6x$$

имеет хотя бы одно решение x .

Решение. Перепишем уравнение в виде:

$$(3x - a^2 + ab - b^2)^2 + (2x^2 - a^2 - ab)^2 + (x - 3)^2 = 0.$$

Сумма квадратов, будучи неотрицательной, равна нулю тогда и только тогда, когда каждое слагаемое обращается в нуль. Таким образом, наше уравнение равносильно системе

$$\begin{cases} 3x - a^2 + ab - b^2 = 0, \\ 2x^2 - a^2 - ab = 0, \\ x - 3 = 0. \end{cases}$$

Из третьего уравнения имеем $x = 3$; подставляя это значение в первое и второе уравнения, получим систему

$$\begin{cases} a^2 - ab + b^2 = 9, \\ a^2 + ab = 18. \end{cases} \quad (1)$$

Умножим первое уравнение системы (1) на -2 и сложим со вторым уравнением. Придём к уравнению

$$a^2 - 3ab + 2b^2 = 0,$$

то есть

$$(a - b)(a - 2b) = 0.$$

Отсюда $a = b$ или $a = 2b$. Подставляя это в любое из уравнений системы (1) (проще во второе), найдём в итоге искомые пары (a, b) .

Ответ: $(3, 3)$, $(-3, -3)$, $(2\sqrt{3}, \sqrt{3})$, $(-2\sqrt{3}, -\sqrt{3})$.

Задача 2. (*МГУ, ф-т почвоведения, 1983*) Найти все значения α , которые удовлетворяют условию $5 < \alpha < 16$ и при которых уравнение

$$1 + \cos^2 \left(\frac{\alpha x}{2} + \frac{3\pi}{8} \right) = \left(\frac{1}{3} \right)^{|\cos \pi x - \sin \pi x|}$$

относительно x имеет хотя бы одно решение, удовлетворяющее условию $1 \leq x \leq 2$.

Решение. Поскольку выполнены неравенства

$$1 + \cos^2 \left(\frac{\alpha x}{2} + \frac{3\pi}{8} \right) \geq 1, \quad \left(\frac{1}{3} \right)^{|\cos \pi x - \sin \pi x|} \leq 1,$$

наше уравнение равносильно системе

$$\begin{cases} 1 + \cos^2 \left(\frac{\alpha x}{2} + \frac{3\pi}{8} \right) = 1, \\ \left(\frac{1}{3} \right)^{|\cos \pi x - \sin \pi x|} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\alpha x}{2} + \frac{3\pi}{8} = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}, \\ \cos \pi x - \sin \pi x = 0. \end{cases}$$

Из второго уравнения легко находим: $\pi x = \frac{\pi}{4} + \pi k$ ($k \in \mathbb{Z}$), то есть $x = \frac{1}{4} + k$. По условию должно быть выполнено двойное неравенство $1 \leq x \leq 2$; следовательно, подходит единственное значение $k = 1$, при котором $x = \frac{5}{4}$.

Подставляя $x = \frac{5}{4}$ в первое уравнение системы, получим

$$\alpha = \frac{\pi(1+8n)}{5}.$$

По условию должно быть $5 < \alpha < 16$; значит, годятся значения $n = 1, 2, 3$. В самом деле:

$$\begin{aligned} n \leq 0 &\Rightarrow \alpha \leq \frac{\pi}{5} < 1 < 5; \\ n = 1 &\Rightarrow \alpha = \frac{9\pi}{5} > \frac{9 \cdot 3}{5} > 5; \\ n = 3 &\Rightarrow \alpha = 5\pi < 5 \cdot 3,2 = 16; \\ n \geq 4 &\Rightarrow \alpha \geq \frac{33\pi}{5} > \frac{33 \cdot 3}{5} > 16. \end{aligned}$$

Ответ: $\frac{9\pi}{5}, \frac{17\pi}{5}, 5\pi$.

Задача 3. (МГУ, ф-т психологии, 1988) Найдите наибольшее значение параметра a , при котором неравенство

$$a\sqrt{a}(x^2 - 2x + 1) + \frac{\sqrt{a}}{x^2 - 2x + 1} \leq \sqrt[4]{a^3} \cdot \left| \sin \frac{\pi x}{2} \right|$$

имеет хотя бы одно решение.

Решение. Для удобства сделаем замену $b = \sqrt[4]{a}$. Тогда неравенство примет вид

$$b^6(x-1)^2 + \frac{b^2}{(x-1)^2} \leq b^3 \left| \sin \frac{\pi x}{2} \right|. \quad (2)$$

Если $b = 0$, то любое значение $x \neq 1$ является решением неравенства (2), поэтому $b = 0$ годится. Теперь надо выяснить, существуют ли $b > 0$, при которых неравенство (2) имеет решения. В предположении $b > 0$ делим обе части неравенства (2) на b^3 :

$$b^3(x-1)^2 + \frac{1}{b(x-1)^2} \leq \left| \sin \frac{\pi x}{2} \right|. \quad (3)$$

В силу неравенства между средним арифметическим и средним геометрическим имеем оценку снизу для левой части неравенства (3):

$$b^3(x-1)^2 + \frac{1}{b(x-1)^2} \geq 2 \cdot \sqrt{b^3(x-1)^2 \cdot \frac{1}{b(x-1)^2}} = 2b.$$

Вместе с тем для правой части неравенства (3) имеем очевидную оценку сверху: $\left| \sin \frac{\pi x}{2} \right| \leq 1$. Поэтому если $2b > 1$, то неравенство (3) не имеет решений; значит, неравенство (3) может иметь решения лишь при условии $2b \leq 1$, то есть при $b \leq \frac{1}{2}$.

Покажем, что при $b = \frac{1}{2}$ неравенство (3) имеет решения. С этим b оно примет вид

$$\frac{1}{8}(x-1)^2 + \frac{2}{(x-1)^2} \leq \left| \sin \frac{\pi x}{2} \right|. \quad (4)$$

Непосредственной проверкой убеждаемся, что при $x = 3$ неравенство (4) выполнено¹. Итак, наибольшее значение b равно $\frac{1}{2}$, и потому искомое наибольшее значение a равно $\frac{1}{16}$.

Ответ: $\frac{1}{16}$.

Задача 4. (*МГУ, филологич. ф-т, 1985*) Для каждого значения a решить уравнение

$$4 \cos x \sin a + 2 \sin x \cos a - 3 \cos a = 2\sqrt{7}.$$

Решение. Здесь работает идея, которая обсуждалась в листке «Параметр как переменная». Мы меняем ролями величины x и a , воспринимая наше уравнение как уравнение относительно переменной a с параметром x .

Переписываем уравнение в следующем виде:

$$A \sin a + B \cos a = 2\sqrt{7}, \quad (5)$$

где

$$A = 4 \cos x, \quad B = 2 \sin x - 3.$$

Замечая, что $B \neq 0$ при любом x , преобразуем² уравнение (5):

$$\sqrt{A^2 + B^2} \left(\frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2}} \sin a + \frac{B}{\sqrt{A^2 + B^2}} \cos a \right) = 2\sqrt{7}.$$

Поскольку

$$\left(\frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2}} \right)^2 + \left(\frac{B}{\sqrt{A^2 + B^2}} \right)^2 = 1,$$

существует угол φ такой, что

$$\frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \cos \varphi, \quad \frac{B}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \sin \varphi.$$

Тем самым уравнение (5) приобретает вид:

$$\sqrt{A^2 + B^2} (\sin a \cos \varphi + \cos a \sin \varphi) = 2\sqrt{7},$$

то есть

$$\sqrt{A^2 + B^2} \sin(a + \varphi) = 2\sqrt{7}. \quad (6)$$

Пусть

$$L = \sqrt{A^2 + B^2} \sin(a + \varphi)$$

есть левая часть уравнения (6). Для L имеем оценку сверху:

$$L \leq \sqrt{A^2 + B^2} = \sqrt{(4 \cos x)^2 + (2 \sin x - 3)^2} = \sqrt{16 \cos^2 x + 4 \sin^2 x - 12 \sin x + 9}.$$

¹Мы не обязаны объяснять на экзамене, откуда взялся пример $x = 3$. Но всё же, из каких соображений он найден? Правая часть неравенства (4) не превосходит 1, а в силу неравенства между средними левая часть (4) не меньше 1. Следовательно, неравенство (4) может быть выполнено лишь в случае равенства, которое достигается при равенстве слагаемых в левой части.

²Это метод вспомогательного аргумента, изложенный в статье «[Тригонометрические уравнения. 2](#)».

Используя основное тригонометрическое тождество $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$, получаем:

$$L \leq \sqrt{25 - 12 \sin^2 x - 12 \sin x}.$$

В подкоренном выражении выделим полный квадрат:

$$25 - 12 \sin^2 x - 12 \sin x = 25 - 3(4 \sin^2 x + 4 \sin x + 1 - 1) = 28 - 3(2 \sin x + 1)^2.$$

Таким образом, имеем:

$$L \leq \sqrt{28 - 3(2 \sin x + 1)^2} \leq \sqrt{28} = 2\sqrt{7}. \quad (7)$$

Сопоставляя эту оценку с уравнением (6), мы видим, что это уравнение может иметь решения относительно a лишь в том случае, когда в неравенстве (7) достигается равенство, то есть при $\sin x = -\frac{1}{2}$. Имеем, стало быть, два случая.

1. $x = -\frac{\pi}{6} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$. Тогда $A = 2\sqrt{3}$, $B = -4$, и уравнение (5) принимает вид:

$$\sqrt{3} \sin a - 2 \cos a = \sqrt{7},$$

или

$$\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}} \sin a - \frac{2}{\sqrt{7}} \cos a = 1. \quad (8)$$

Поскольку $\left(\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}}\right)^2 + \left(\frac{2}{\sqrt{7}}\right)^2 = 1$, существует такой угол φ , что

$$\cos \varphi = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}}, \quad \sin \varphi = \frac{2}{\sqrt{7}};$$

при этом можно выбрать φ на интервале $(0; \frac{\pi}{2})$, так что $\varphi = \arcsin \frac{2}{\sqrt{7}}$. Уравнение (8) теперь даёт нам:

$$\sin a \cos \varphi - \cos a \sin \varphi = 1 \Leftrightarrow \sin(a - \varphi) = 1 \Leftrightarrow a - \varphi = \frac{\pi}{2} + 2\pi k,$$

то есть

$$a = \frac{\pi}{2} + \arcsin \frac{2}{\sqrt{7}} + 2\pi k \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

2. $x = -\frac{5\pi}{6} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$. Тогда $A = -2\sqrt{3}$, $B = -4$, и уравнение (5) принимает вид:

$$-\sqrt{3} \sin a - 2 \cos a = \sqrt{7},$$

или

$$\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}} \sin a + \frac{2}{\sqrt{7}} \cos a = -1.$$

Дальше действуем аналогично и получаем

$$a = -\frac{\pi}{2} - \arcsin \frac{2}{\sqrt{7}} + 2\pi k \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Остается записать ответ.

Ответ: Если $a = \frac{\pi}{2} + \arcsin \frac{2}{\sqrt{7}} + 2\pi k$, то $x = -\frac{5\pi}{6} + 2\pi n$; если $a = -\frac{\pi}{2} - \arcsin \frac{2}{\sqrt{7}} + 2\pi k$, то $x = -\frac{5\pi}{6} + 2\pi n$ ($k, n \in \mathbb{Z}$); при остальных a решений нет.

Задачи

1. («Покори Воробьёвы горы!», 2015, 10–11.5) При каждом значении a решите уравнение

$$|x - 1| + |x + 1| + |x - 2| + |x + 2| + |x - 3| + |x + 3| + \dots + |x - 2015| + |x + 2015| + \\ + 2x^2 + 2a^2 + 4030^2 - 8060x - 8060a = 4030x.$$

Если $a = 2015$, то $x = 2015$; если $a \neq 2015$, то применить here

2. («Покори Воробьёвы горы!», 2019.5) При каких значениях $n = 1, 2, \dots, 9$ уравнение

$$\left(\log_2 \sin \left(\pi x + \frac{7\pi n}{6} \right) + \log_2 \sin \left(\pi x + \frac{7\pi n}{6} \right) + 0,5 \right) \cdot \\ \cdot \log_2 \left(9 \cdot 3^{4x^2-6x} - 2 \cdot 3^{2x^2-3x+2} + 17 \right) = 3 \log_2 \sin \left(\pi x + \frac{7\pi n}{6} \right) + 1,5$$

имеет решение?

{6, 9}

3. (МГУ, геологич. ф-т, 1990) Найти все пары (a, b) , при которых уравнение

$$(3x^2 - 2a^2 + ab)^2 + (3a^2 - ab + 2b^2 - 12x)^2 + 4 = 4x - x^2$$

имеет хотя бы один корень.

(2, -2), (-2, 2), $\left(2\sqrt{2}, \sqrt{2}\right)$, $\left(-2\sqrt{2}, -\sqrt{2}\right)$

4. (МГУ, физический ф-т, 1996) При каждом a решить уравнение

$$(\log_2 3)^{\sqrt{x+a+2}} = (\log_9 4)^{\sqrt{x^2+a^2-6a-5}}.$$

Если $a = \frac{1-\sqrt{3}}{2}$, то $x = \frac{-5+\sqrt{3}}{2}$; если $a = \frac{1+\sqrt{3}}{2}$, то $x = \frac{-5-\sqrt{3}}{2}$; иначе применяется here

5. (МГУ, ИСАА, 1994) Найти все a , при которых уравнение

$$a^2x^2 + 2a \left(\sqrt{2} - 1 \right) x + \sqrt{x-2} = 2\sqrt{2} - 3$$

имеет хотя бы один корень.

$a = \frac{2}{\sqrt{2}-1}$

6. (МГУ, физический ф-т, 2001) При каждом α найти все корни уравнения

$$\cos 2x + 2 \sin^2(x + \alpha) + 2 = \sin \alpha,$$

принадлежащие отрезку $[\pi; 2\pi]$.

Если $\alpha = \frac{\pi}{n} + 2\pi u$ ($u \in \mathbb{Z}$), то $x = \frac{\pi}{3\pi}$; иначе применяется here

7. (*МГУ, мехмат, 1993-05.4*) Найти все $\alpha \in (-\frac{\pi}{2}; 0)$, при которых уравнение

$$\sqrt{2 \cos(x + \alpha) - 1} = \sin 6x - 1$$

имеет хотя бы один корень.

$$\alpha = -\frac{12}{5}, -\frac{12}{5}, \dots$$

8. (*МГУ, химический ф-т, 2001*) При каждом a решить уравнение

$$\sin^2 x + \sin^2 2x + \sin^2 3x - 2a(\sin x + \sin 2x + \sin 3x) + \cos x - \cos 3x + 2a^2 = 0.$$

$$\text{Если } a = 0, \text{ то } x = \pi + 2\pi n \text{ или } x = \frac{\pi}{2\pi n} \text{; если } a \neq 0, \text{ то решений нет}$$

9. (*МГУ, ВМК, 1981*) При каждом a решить уравнение

$$(1 + (a+2)^2) \log_3(2x - x^2) + (1 + (3a-1)^2) \log_{11}\left(1 - \frac{x^2}{2}\right) = \log_3(2x - x^2) + \log_{11}\left(1 - \frac{x^2}{2}\right).$$

$$\text{Если } a = \frac{1}{3}, \text{ то } x = 1; \text{ иначе решений нет}$$

10. (*МГУ, ВМК, 1989*) Найти все a , при которых уравнение

$$\log_{\frac{1}{\pi}} \frac{a^2 + 4\pi^2 + 4}{4x - x^2 - 2(a-2\pi)|x-2| + 4\pi a} = \sqrt{(x-5a+10\pi-34)(|\pi-x|-a+\pi+2)}$$

имеет хотя бы один целочисленный корень.

$$a \in \{2\pi - 8, 2\pi - 1, 2\pi\}$$

11. (*МГУ, геологич. ф-т, 1995*) При каждом a решить систему

$$\begin{cases} x \leq 1, \\ \frac{\log_2(|a|x^2 - 3x + 4)}{\log_2(-3x + 4)} = 5^{-|x|(x+1)^2}. \end{cases}$$

$$\text{Если } a \neq 0, \text{ то } x = 0; \text{ если } a = 0, \text{ то } x = -1$$

12. (*МГУ, геологич. ф-т, 1998*) Найти все a , при которых уравнение

$$\left| \frac{x^2 - 4ax + 4a^2 + 1}{x - 2a} \right| + x^2 - 2x - 1 = 0$$

имеет хотя бы один корень.

$$1 = a \text{ или } 0 = a$$

13. (*МГУ, ф-т почвоведения, 1983*) Найти все $a \in (2; 5)$, при которых уравнение

$$\log_2(3 - |\sin ax|) = \cos\left(\pi x - \frac{\pi}{6}\right)$$

имеет хотя бы один корень на отрезке $[2; 3]$.

$$a = \frac{9\pi}{16}, \frac{13\pi}{16}$$

14. (*МГУ, филологич. ф-т, 1985*) Для каждого a решить уравнение

$$3 \cos x \sin a - \sin x \cos a - 4 \cos a = 3\sqrt{3}.$$

$$\text{Если } a = \frac{6}{5\pi} + 2\pi k, \text{ то } x = \frac{6}{\pi} + 2\pi n; \text{ если } a = -\frac{6}{5\pi} + 2\pi k, \text{ то } x = \frac{6}{5\pi} + 2\pi n \quad (k, n \in \mathbb{Z}); \text{ иначе } a \text{ решений нет}$$

15. (*МГУ, ф-т психологии, 1988*) Найти наибольшее a , при котором неравенство

$$\sqrt{a^5}(8x - x^2 - 16) + \frac{\sqrt{a}}{8x - x^2 - 16} \geq -\frac{2}{3}a|\cos \pi x|$$

имеет хотя бы одно решение.

$$\frac{6}{1}$$

16. (*МГУ, ФНМ, 2004*) Найти все b , при каждом из которых неравенство

$$\left(3 - 2\sqrt{2}\right)^x + (b^4 + 12 - 6b^2) \cdot \left(3 + 2\sqrt{2}\right)^x + 9^t + \frac{b^2}{4} + b \cdot 3^t - \sqrt{12} \leq 0$$

имеет хотя бы одно решение (t, x) .

$$\underline{\Sigma} \wedge - = q$$

17. (*МГУ, ФНМ, 2002*) Найти все a , при каждом из которых неравенство

$$4^x + 4^{-x} + 8|2^x + 2^{-x} - a| + 11a < 26 + 2a(2^x + 2^{-x})$$

имеет хотя бы одно решение.

$$a \in (-\infty; -4) \cup (7; +\infty)$$

18. (*МГУ, ф-т почвоведения, 1994*) Найти все пары (a, b) , при которых система

$$\begin{cases} a + \sin bx \leq 1, \\ x^2 + ax + 1 \leq 0 \end{cases}$$

имеет единственное решение.

$$a = 2, b = \frac{\pi}{2} + 2\pi n \quad (n \in \mathbb{Z}); \quad a = -2, b \in \mathbb{R}$$

19. (*МГУ, географич. ф-т, 1986*) Для каждого значения параметра a , удовлетворяющего неравенствам $0 < a < 2$, найдите наименьшее значение выражения

$$x^2 + y^2 - 2a(x + y)$$

при условии $\cos \frac{\pi xy}{2} = 1$.

$$\boxed{\text{Если } a \in (0; 4 - 2\sqrt{2}], \text{ то наименьшее значение пары } -a^2; \text{ если } a \in (4 - 2\sqrt{2}; 2), \text{ то наименьшее значение пары } 8 - 8a}$$

20. (*МГУ, географич. ф-т, 1985*) Найдите все числа a , удовлетворяющие условию $-1 < a < 1$, для которых выражение

$$1 + 2\sqrt{x^2 - 2axy + y^2 - 6y + 10}$$

принимает наименьшее значение лишь при одной паре чисел (x, y) .

$$\boxed{\left[\frac{0,1\wedge}{1} : \frac{0,1\wedge}{1} - \right] \ni a}$$

21. (*МГУ, ф-т почвоведения, 1988*) Найти все значения параметра p , при каждом из которых существует единственная пара чисел (x, y) , удовлетворяющая условиям

$$\begin{cases} x^2 + 2px + 3p^2 + 3p + 3 \leq 3 \sin y - 4 \cos y, \\ 0 \leq y \leq 2\pi. \end{cases}$$

$$\boxed{\frac{\xi}{1} = d \text{ или } 2 - d}$$

22. (*МГУ, экономический ф-т, 2004*) Найти наибольшее значение ω , при котором имеет решение система

$$\begin{cases} 4 \sin^2 y - \omega = 16 \sin^2 \frac{2x}{7} + 9 \operatorname{ctg}^2 \frac{2x}{7}, \\ (\pi^2 \cos^2 3x - 2\pi^2 - 72) y^2 = 2\pi^2(1 + y^2) \sin 3x. \end{cases}$$

-14

23. (*МГУ, ВМК, 1999*) При каких a уравнение

$$3^{x^2+2ax+4a-3} - 2 = \left| \frac{a-2}{x+a} \right|$$

имеет ровно два корня, лежащих на отрезке $[-4; 0]$?

$$\boxed{a \in [1; 2) \cup (2; 3]}$$

24. (*МГУ, географич. ф-т, 1999*) При каких значениях параметра a система

$$\begin{cases} y^2 - (2a+1)y + a^2 + a - 2 = 0, \\ \sqrt{(x-a)^2 + y^2} + \sqrt{(x-a)^2 + (y-3)^2} = 3 \end{cases}$$

имеет единственное решение?

$$\boxed{[-2; 1) \cup (1; 4]}$$

25. (*МГУ, химический ф-т, 1994*) При каких q разрешима система

$$\begin{cases} x^2 + qx + 3 = 0, \\ \sin^2 q\pi + \cos^2 \frac{\pi x}{2} + 2^{y^2} = \sin \frac{\pi x}{2} ? \end{cases}$$

Найдите её решения.

$$0 = \pm 4, \text{ если } q = 4, \text{ то } x = -3, y = 0; \text{ если } q = -4, \text{ то } x = 1, y = 1?$$

26. (*МГУ, мехмат, 1978.4*) Найти все a , при которых система

$$\begin{cases} x^2 + 2xy - 7y^2 \geq \frac{1-a}{a+1}, \\ 3x^2 + 10xy - 5y^2 \leq -2 \end{cases}$$

имеет хотя бы одно решение.

$$1 - > a$$

27. (*МГУ, мехмат, 1995-07.6*) Найти все $\alpha \in [0; 2\pi]$, при которых система

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + 2z(x + y + z) - \sin \alpha = 0, \\ (x + 1) \sin^2 \frac{\alpha}{2} + y^2 \sqrt{x} + \alpha^2 \sqrt{z} + \sin \frac{3\alpha}{2} = 0 \end{cases}$$

имеет хотя бы одно решение.

$$\alpha \in \{0, \pi, 2\pi\}$$

28. (*МГУ, мехмат, 1988.6*) Найти все a , при которых система

$$\begin{cases} \sin x \sin y = \frac{1}{z^2}, \\ \cos x \cos y = -\frac{(x+y)^2}{(a-\pi)^2}, \\ 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}, \\ z > 0 \end{cases}$$

имеет единственное решение.

$$a \in [-2\pi; 0) \cup (2\pi; 4\pi]$$

29. (*МГУ, биологич. ф-т, 2003*) Найти все значения b , при которых система уравнений

$$\begin{cases} (\log_b f(x) - 1)^2 + (y^2 - 5 \cdot 10^3 \cdot y + 2b)^2 = 0, \\ z^2 - (b - 2 \cdot 10^6) \cdot z + 25 \cdot 10^{10} = 0 \end{cases}$$

имеет хотя бы одно решение, где

$$f(x) = |x| + |x - 1^2| + |x - 2^2| + \dots + |x - 104^2|.$$

$$b \in [286624; 1000000] \cap [3000000; 3125000]$$